

Servicios para párpados

Los problemas más comunes en los párpados

Ptosis

La ptosis se refiere a la caída del párpado y afecta solamente al párpado superior de uno o ambos ojos, como resultado de una deficiencia en la acción del músculo que lo levanta o su tendón. La ptosis puede ser congénita o adquirida;



La ptosis congénita se hereda o es un defecto aislado en el nacimiento y casi siempre es causada por el desarrollo inadecuado del músculo que levanta el párpado. Se observa poco tiempo después del nacimiento. En pocas ocasiones, la ptosis adulta puede ser causada por enfermedad muscular.

La cirugía para la ptosis muscular tiene el propósito de apretar el tejido del músculo que levanta el párpado o, en casos severos, a conectar el mecanismo paralizado de elevación a los músculos más sanos de la ceja por medio de un sistema interno de suspensión. Aunque estos procedimientos pueden levantar el párpado a una posición más alta, el músculo distrófico nunca será normal y, por lo tanto, siempre habrá un grado de deficiencia funcional al abrir y cerrar los párpados.

Afortunadamente, la gran mayoría de casos son de **ptosis adquirida**, cuyo inicio fue después del nacimiento como resultado de la edad, un trauma o enfermedad muscular o neurológica. El problema se relaciona con el deterioro del tendón que eleva el párpado, en lugar de con el propio músculo. Las áreas de adelgazamiento, las rasgaduras localizadas o el desprendimiento completo que ocurre algunas veces, no permiten que se transmita la elevación. La cirugía trata de unir nuevamente el músculo estirado a su ubicación normal o eliminar el exceso de piel que hace que el párpado baje.

Si tiene alguna pregunta o comentario haga clic aquí para comunicarse con nosotros.

Ectropión



Los pacientes con ectropión tienen una curva en el párpado inferior que hace que el ojo quede expuesto y se seque. La estructura de soporte del párpado inferior se puede comparar con una hamaca, con una pieza central tipo cartílago que endurece y que está unida por medio de dos tendones al hueso de la órbita, en cada lado del ojo. Si los tendones se estiran debido al desgaste o a un golpe o incluso por otra cirugía de la vista, el párpado puede perder su adherencia normal a la superficie del ojo y **curvarse hacia afuera**, una afección que se conoce como ectropión.

Si tiene ectropión, el viento y el polvo pueden secar e irritar el delicado tejido que recubre la parte posterior del párpado expuesto. Se desarrolla lagrimeo debido a que el drenaje del ducto de los párpados se aleja de la órbita y ya no puede recoger la humedad. Eventualmente, un ojo con ectropión puede desarrollar cicatrices.

La cirugía de párpado para ectropión está diseñada para apretar los tendones estirados y acortar el párpado también estirado. Si los tendones están muy rasgados, se puede crear un medio de soporte totalmente nuevo prestando tejidos de otros cercanos más sanos.

Si tiene alguna pregunta o comentario haga clic [aquí](#) para comunicarse con nosotros.

Entropión

El entropión es una afección en la cual el párpado inferior se dobla hacia adentro. La forma más común de entropión se desarrolla de un debilitamiento y estiramiento de los tendones que dan soporte de los párpados hacia la orilla del hueso de la órbita. Esto permite que el párpado inestable **gire hacia adentro contra el ojo**. El dolor causado por el roce de las pestañas y la piel contra la córnea puede ser severo y el riesgo de entropión para la visión es inmediato.




Otra forma de entropión se asocia con las cicatrices de un trauma o infección en el recubrimiento posterior del párpado o dentro de la estructura interna del

párpado. Aunque no es muy común en los Estados Unidos, esta variante del entropión está causando ceguera en países no desarrollados.

La corrección quirúrgica del tipo más común de entropión conlleva la rotación del margen del párpado hacia atrás, hacia su posición normal, al apretar los tendones y la capa que parece tendón.

Si tiene alguna pregunta o comentario, haga clic [aquí](#) para comunicarse con nosotros.

Chalazión



El chalazión es una inflamación crónica y no una infección de la glándula de aceite del párpado, que estimula la formación de un quiste que lo rodea.

Puede aparecer un chalazión de pronto o poco a poco y se puede confundir con un orzuelo. Aunque el chalazión puede reducir en varias semanas y posiblemente ya no sienta dolor, su núcleo frecuentemente queda intacto. En algún momento, el quiste vuelve a salir una y otra vez y gradualmente puede deformar el párpado y deformar las pestañas.

La eliminación del chalazión es un procedimiento quirúrgico menor que tarda aproximadamente diez minutos. El chalazión frecuentemente es confundido con un orzuelo. Un orzuelo es una infección o pequeño absceso alrededor de la raíz de la pestaña.